

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Βγάλτε το μολυσμένο ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του αλευρώδη σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, κοκκοειδή, βαμβακοειδή, ακάρεα, κολοκασίδια και τζιτζικάρια, για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στο δόσημο δράσης, δρα δέ επαφής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως του φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι «κρύο». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί βρόχινο ή αποστραμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή αναδευση. Η αναδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΤΕΡΙΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ) για **Αλευρώδης**, **Αφίδες**, **Θρίπες**, **Κοκκοειδή**, **Ακάρεα**, **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά) για **Αφίδες**, **Θρίπες**, **Κοκκοειδή**, **Ακάρεα**, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλάδι) για **Αφίδες**, **Κοκκοειδή**, **Θρίπες**, **Ψύλλια**, **Ακάρεα** και **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ιβερικόνα, Ροδάκινα) για **Αφίδες**, **Θρίπες**, **Κοκκοειδή**, **Βαμβακοειδή**, **Ακάρεα** με δόσεις 1900 κ.ε.κ.ακ./στρέμμα (min-max) ή 1500 κ.ε.κ.ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Τομάτα (Y+Θ), Αγγούρι (Y+Θ), Πιπεριά (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ), Φασόλι (Y+Θ), Μπιζέλι (Y+Θ), Κολοκασιοειδή (Y+Θ), Λάχανο (Y+Θ), Μανιταράκια (Y+Θ) για Αλευρώδης, Αφίδες, Βρομοειδείς, Θρίπες, Τούτα, Ακάρεα, Αμύγδα, Χρήσιμες Ησσονος Σημιασίας Τζιτζικάρια, Αφίδες, Κοκκοειδή, Ακάρεα, Βαμβακοειδή* (Y) Φρυγανισοειδή* (Y) Ιακκίνα, Μαύρα ή άσπρα (Y) Χρήσιμες Ησσονος Σημιασίας για Ακάρεα, Θρίπες, Αγκυράρα* (Y) Χρήση Ησσονος Σημιασίας για Aphid fabae, Aphid gossypii, Brachycaudus cardui, Myzus persicae, Tetranychus, Panizari* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Μπρόκοβο* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Αλευρώδεις, Ακάρεα, Ξέλινο* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Τετράνυχος, Θρίπες, Ξεσκουλά* (φύλλα) (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ραδίκι* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ξεσκουλά* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Θρίπες, Φασόλι* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Θρίπες, Ακάρεα, Μανιταράκια* (Χρήση Ησσονος Σημιασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ακάρεα, Μπάγια για Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδεις, Ακάρεα με δόσεις 750-1900 κ.ε.κ.ακ./στρέμμα (min-max) ή 1500-1900 κ.ε.κ.ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΚΑΛΑΜΠΙΕΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΕΣΤΕΡΙΟΚΟΥ ΧΑΡΟΥ για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα και **Ελιά** για Χρήσιμες Ησσονος Σημιασίας, Ακάρεα*, Κοκκοειδή*, Κηκιδόμυγα*, Πυρρίδα*, Καλοκόρη*, Βαμβακοειδή* με δόσεις 1500-1900 κ.ε.κ.ακ./στρέμμα (min-max) ή 1500-1900 κ.ε.κ.ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

CLAVITUS 13 SL GREC/12Z 1lt Bottle Label



Clavitus® 13SL

syngenta®

GROUP 28 INSECTICIDE

UFI: UX5F-S95K-5M0Q-08KD

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14783/24.11.2021

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

potassium salts of fatty acids (άλατα καλίου λιπαρών οξέων): 13,04 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83,27% β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

για την καταπολέμηση του αλευρώδη σε τομάτα, αγγούρι και άλλων εχθρών σε διάφορες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 28ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΘΙΝΕΣ Τ.Κ. 190 14, ΤΗΛ: 22950 45100

ΔΙΑΝΟΜΕΤΕΣ: Syngenta Hellas Μονοπωρόσωση ΑΕΒΕ Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49 ΤΗΛ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr 0ΕΞ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Ξινόδος, Τηλ.: 251 0796340-3

1lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα.
- *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απωλειές που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 0 ημέρες (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής).

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στην αχλάδι να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις ευαίσθητες ποικιλίες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματα της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίστει:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική potassium salts of fatty acids, με άγνωστο μηχανισμό δράσης (ομάδα unknown) κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ή να αποκηλίστει:

Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρι παντελόνι και μακριά μανίκι πουκάμισο.

Συνδυαστικότητα: ---

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να προστατεύεται από συνθήκες παγετού.



1lt e