

Collis® 20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπόσκαλιντ/ Κρεσοξίμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: **500** κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του ωιδίου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μίγμα δύο δραστικών συστατικών, kresoxim-methyl και boscalid, με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Το kresoxim-methyl παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) και εμφανίζει διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid επίσης εμποδίζει την κυτταρική αναπνοή, αλλά σε διαφορετική θέση δράσης και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το Collis® 20/10 SC παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Συνιστώνται ψεकाσμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)

- **Αμπέλι** – Για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Uncinula necator*). Δόση: 40. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Συντήνονται προληπτικοί ψεκασμοί, από την έναρξη της άνθησης μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών, σε διαστήματα των 10 – 14 ημερών. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
- **Αγγούρι, Κολοκύθι (θερμοκήπιο-αγρός)** – Για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Δόση: 40-50 (1). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
- **Πεπόνι, Καρπούζι (αγρός)** – Για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Erysiphe cichoracearum*). Δόση: 40-50 (1). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ή εξέλιξης της ασθένειας.
2. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
 - Εφαρμόστε το Collis® 20/10 SC, προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
 - Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη από τον παρασκευαστή δόση.
 - Εφαρμόστε το Collis® 20/10 SC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, με όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Στο αμπέλι να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl. Στο αγγούρι και κολοκύθι θερμοκηπίου να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν pyriproxyfen, pymetrozine και cyromazine, σε ψεκασμούς φυλλώματος, ενδέχεται να προκληθεί περιφερειακή νέκρωση των νεαρών φύλλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδυασμού στο βυτίο με περισσότερα του ενός φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή προσθήκης προϊόντων θρέψης σε πολλαπλούς συνδυασμούς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σταφύλια: 35 ημέρες.

Αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι: 3 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Με άφθονο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες από -5°C έως 30°C .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται

υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εισέρχετε στις ψεκασμένες καλλιέργειες πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μιαν ασέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

Collis® 20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπόσκαλιντ/ Κρεσοξιμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Collis SC 500cc 101503β

Περιεχόμενο: **500** κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του ωιδίου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ