

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
●Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ●Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ●Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. ●Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ●Φοράτε γάντια και οδόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής. ●Φοράτε γάντια και οδόσωμη προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση επανεισόδου σε ψεκασμένες καλλιέργειες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτετε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αράωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
Αντιδοτο: Πενικιλλαμίνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους μικροοργανισμούς εδάφους η συνολική εφαρμζόμενη ποσότητα του προϊόντος αυτού και άλλων χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
400 γρ. σε μεταλλικό χαλκό ανά στρέμμα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **50 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα **20 μέτρα** να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, για τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακρόδρυων, ελιάς, αμπελιού, ακτινιδιάς και των καλλιωπιστικών δένδρων και θάμνων.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, τηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, για τις καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας, πεπονιού, αγγουριού, μαρούλιου, κολοκυθάκι, κρεμμυδιού, σκόρδου και των καλλιωπιστικών φυτών.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού

διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

Συνδυαστικότητα: ---

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: 6 ώρες μετά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και 8 ώρες μετά την εφαρμογή σε θερμοκήπιο /κλειστούς χώρους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες, **Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Ακρόδρυα, Ελιά:** Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής, **Αμπελι:** 21 ημέρες, **Ακτινίδιο:** 20 ημέρες, **Πεπόνι (Υ), Μαρούλι (Υ):** 7 ημέρες, **Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ)** (για ναυπή κατανάλωση), **Μελιτζάνα (Υ+Θ), Σκόρδο (Υ), Κρεμμύδι (Υ):** 3 ημέρες, **Τομάτα (Υ+Θ)** (για βιομηχανική χρήση): 10 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση (spotting) στα επιτραπέζια σταφύλια. Μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία οиноποίησης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (ασκούλδες, σάκoi), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με οκίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Product names marked © or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg e

COPRANTOL DUO GREC/3Z 1kg Bag



Coprantol® Duo
28 WG

syngenta

Μεταλλικός χαλκός (Cu)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60850/29.03.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μεταλλικός χαλκός (Cu) 28%β/β (σε μορφές οξυχλωριούχου χαλκού 24,5% β/β + υδροξειδίου του χαλκού 24,4% β/β) Βοηθητικές ουσίες: 51,1% (β/β)

Μυκητοκτόνο / βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ISAGRO S.p.A.

Caldera Park, Via Caldera 21,

20153 Milano, Italia

Tηλ: +39 02 40 901 426,

Fax: +39 02 40 901 320

Email: oschifanella@isagro.com,

www.isagro.com



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Λ. Ανθοούας, Ανθοούσα Αττικής, 153 49

Tηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Το παρόν σκεύασμα βεβαιώνεται από τη ΔΗΩ για χρήση στη βιολογική γεωργία»

Φάσμα δράσης:
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Γκρέιφ Φρουτ): Για αυτοφθόρα καρπών (Phytophthora sp.): 267-400 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 400 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό στην αρχή αλλήλαγής χρώματος των καρπών (BBCH 73).
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): α) Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pirina): 200-600 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 300 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό μεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της ανθοφορίας (BBCH 03-55).
β) Για Καρκίνωση (Nectria galligena): 200-400 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 300-400 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό κατά την πτώση των φύλλων ή μεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της ανθοφορίας (BBCH <55 ή >91).
Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά): Για Εξώσασκο (Taphrina deformans), Κορύνεο (Coryneum beijerinckii), Φουζικλάδιο (Venturia carpophila): 180-400 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 270-400 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό κατά την πτώση των φύλλων ή μεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της ανθοφορίας (BBCH <55 ή >91).
Ακρόδρυα (Καστανιά, Φουντουκιά): Για Μυκοσφαίρελλα (Mycosphaerella sp.), Βακτηριώσεις (Xanthomonas sp.): 165-200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 300 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-180 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή.

Καρυδιά: Για Μυκοσφαίρελλα (Mycosphaerella sp.), Βακτηριώσεις (Xanthomonas sp.): 195-230 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 350 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-180 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή.
Αμπελι: Για Περονόσπορο (Plasmopara viticola) και Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii): Δόσεις: α) 330-1000 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με ψεκασμούς από την έκπτυξη του 3ου φύλλου έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 13-60) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
β) Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides*, Colletotrichum acutatum*, Colletotrichum clavatum*): 200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη ανάπτυξης των νέων φύλλων μέχρι οι βλαστοί να φτάσουν το 70% του μεγέθους τους (BBCH 15- 37). Η δεύτερη εφαρμογή όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του μεγέθους του μέχρι να έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του (BBCH 71-79).

Ελιά: α) Για Κυκλόκονιο (Spilocaea oleagina): 200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με ψεκασμούς πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH <59 ή >89).
β) Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides*, Colletotrichum acutatum*, Colletotrichum clavatum*): 200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη ανάπτυξης των νέων φύλλων μέχρι οι βλαστοί να φτάσουν το 70% του μεγέθους τους (BBCH 15- 37). Η δεύτερη εφαρμογή όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του μεγέθους του μέχρι να έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του (BBCH 71-79).

Ελιά: α) Για Κυκλόκονιο (Spilocaea oleagina): 200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με ψεκασμούς πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH <59 ή >89).
β) Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides*, Colletotrichum acutatum*, Colletotrichum clavatum*): 200 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 200 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη ανάπτυξης των νέων φύλλων μέχρι οι βλαστοί να φτάσουν το 70% του μεγέθους τους (BBCH 15- 37). Η δεύτερη εφαρμογή όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του μεγέθους του μέχρι να έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του (BBCH 71-79).

1. Ενδέχεται η αποτελεσματικότητα κατά του Xanthomonas sp. στην καρυδιά να είναι μειωμένη.
2. Η συνολική εφαρμζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
3. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες: αχλαδιάς Κρουστάλλι και Κοντούλα, επιτραπέζιου σταφύλιου Σουλτανία και Κορινθιακή σταφίδα, ελιάς Κορωνέικη και Καθαμών καθώς και στα καλλιωπιστικά.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

Ακτινιδιά: Για Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae pv.actinidiae): Δόσεις: α) 115-170 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 170 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με ψεκασμούς μετά την άνθηση (BBCH 70) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
β) 200-300 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 300 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH <59 ή >89).

Σολανώδη (Τομάτα Υ&Θ, Μελιτζάνα Υ&Θ): Για Περονόσπορο (Phytophthora infestans): 310-415 (Υ) και 210-500 (Θ) γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 250 (Υ+Θ) γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 (Υ) και 50-120 (Θ) λίτρα/στρέμμα. Μέχρι πέντε (5) εφαρμογές με ψεκασμούς από την έκπτυξη του 5ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι Υ&Θ, Κολοκυθάκι Υ &Θ): Για Ψευδοπερονόσπορο (Pseudoperonospora cubensis): 310-415 (Υ) και 210-500 (Θ) γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 250 (Υ+Θ) γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 (Υ) και 50-120 (Θ) λίτρα/στρέμμα. Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με ψεκασμούς από την έκπτυξη του 3ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13-89) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

Πεπόνι (Υ): Για Ψευδοπερονόσπορο (Pseudoperonospora cubensis): 310-415 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 250 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι πέντε (5) εφαρμογές με ψεκασμούς από την έκπτυξη του 3ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13-89) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
Μαρούλι (Υ): Για Περονόσπορο (Bremia lactucae): 310-415 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 250 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής, από το 3ο φύλλο (BBCH 13) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

Σκόρδο (Υ), Κρεμμύδι (Υ): Για Περονόσπορο (Peronospora destructor): 337-450 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 270 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής, από το 5ο φύλλο έως την ωρίμανση των βοθβών (BBCH 14-47) και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
Καλλιωπιστικά φυτά, Καλλιωπιστικά δένδρα και θάμνοι: Για Περονόσπορο (Phytophthora sp.), Κερκόσπορα (Cercospora sp.), Γλοιοσπόριο (Gloeosporium sp.), Σκωρίαση (Puccinia sp.), Βακτηριώσεις (Pseudomonas syringae): 270-450 γρ.σκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού με 270 γρ.σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα/στρέμμα. Καλλιωπιστικά φυτά: Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με ψεκασμούς με την εμφάνιση των συμπτωμάτων και μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. Καλλιωπιστικά δένδρα και θάμνοι: Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό με την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ενδέχεται η αποτελεσματικότητα κατά του Xanthomonas sp. στην καρυδιά να είναι μειωμένη.
2. Η συνολική εφαρμζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
3. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες: αχλαδιάς Κρουστάλλι και Κοντούλα, επιτραπέζιου σταφύλιου Σουλτανία και Κορινθιακή σταφίδα, ελιάς Κορωνέικη και Καθαμών καθώς και στα καλλιωπιστικά.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».