

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να έχετε μαζί σας την συσκευασία του προϊόντος ή την ετικέτα του σε περίπτωση που απευθυνθείτε για ιατρική συμβουλή.
Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή τον ρουχισμό.
Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα.
Να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας σταματήστε αμέσως την εργασία, χορηγήστε πρώτες βοήθειες και συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Μετά την εργασία, πλυθείτε σε όλο το σώμα σχολαστικά και αλλούξτε ρουχισμό.
Πλύνετε τον ρουχισμό εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν τα ξανά χρησιμοποιήσετε.
Εάν το προϊόν εφαρμόζεται σε μίγμα βυτίου μαζί με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, ο χειριστής θα πρέπει να φοράει τον προστατευτικό εξοπλισμό που αναγράφεται στην ετικέτα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.

Το άδειο δοχείο του σκευάσματος ξεπλένεται με τριπλό ξεπλύμα πριν από την απόρριψη. Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό.

Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, αντικαταστήστε το καπάκι και επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στην ανακύκλωση ή στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, όμοιο και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από απευθείας ηλιακό φως σε θερμοκρασία 5-30°C. Να αποθηκεύεται μακριά από φαγητά και ζωοτροφές.

ΚΑΛΗΓΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Το ISABION είναι κατάλληλο για εφαρμογές φυλλώματος και εφαρμογές από έδαφος (ριζοπότισμα).

Μπορεί να εφαρμοστεί με οποιαδήποτε συσκευή εφαρμογής λόγω της υψηλής διαλυτότητας του σκευάσματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες όπως Εσπεριδοειδή, Δημητριακά, Οπωροκρημνικά, Πυρηνόκαρπα*, Μηλοειδή, Ελιά, Αμυγλή, Ακρόδρυα, Βαμβάκι και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες.

Τρόπος εφαρμογής	Δοσολογία προϊόντος ανά εφαρμογή*	Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός φυλλώματος	200-500 κ.εκ./εκατόλιτρο ή 200-500 κ.εκ./στρ (3-4 εφαρμογές)	Πριν ή κατά την διάρκεια κρίσιμων φαινολογικών σταδίων και δυσμενών αβιοτικών συνθηκών
Στο έδαφος	300-400 κ.εκ./στρ (τουλάχιστον 4 εφαρμογές)	

* προσοχή στην χρήση της δαμασκηνιάς να εφαρμόζεται το σκεύασμα με μειωμένη δόση κατά 20% για αποφυγή κινδύνων φυτοτοξικότητας.



Isabion®

syngenta®

Βιοδιεγέρτης

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών

(Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004 – ΦΕΚ 35/16-01-2004)

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύνθεση & Φυσικές Ιδιότητες:

Το ISABION® περιέχει μίγμα ελεύθερων αμινοξέων και πεπτιδίων τα οποία προέρχονται από υδρόλυση πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης (κολλάγονο).

- Ελεύθερα αμινοξέα: 11 % β/β (μέση τιμή)
- Συνολικά αμινοξέα - πεπτιδία: 62.5 % (μέση τιμή)
- PH: 5.5-7.0
- Μέσο μοριακό βάρος υδρόλυμένης πρωτεΐνης: < 2000 Dalton
- Τυπική πυκνότητα στους 20°C: 1.27 g/cm³

Στην σύνθεσή του προϊόντος δεν περιέχονται Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.

Περιγραφή/Γενικά χαρακτηριστικά:

Το ISABION® είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης της ανάπτυξης των φυτών για μεγάλο εύρος καλλιεργειών. Περιέχει ένα συμπυκνωμένο διάλυμα αμινοξέων και πεπτιδίων που προέρχονται από φυσική προέλευση, τα οποία απορροφώνται εύκολα από το φυτό. Τα αμινοξέα και τα πεπτιδία είναι απαραίτητα συστατικά για την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Χαρακτηριστικό του ISABION® είναι ότι ενισχύει τις φυσικές διεργασίες του φυτού βελτιώνοντας την απόδοση του γενικά.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Παρασκευαστής: SICIT GROUP SPA,
Via Arzignano 80, 36072 Chiampo (Vicenza), Italy

Διανομέας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 15349, Τηλ. 2106666612

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Το ISABION μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ανάπτυξης του φυτού αλλού ο βέλτιστος χρόνος εφαρμογής του είναι πριν ή κατά την διάρκεια κρίσιμων φαινολογικών σταδίων (πχ άνθιση, καρποφορία, ωρίμανση καρπών) καθώς και δυσμενών αβιοτικών συνθηκών (π.χ. ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, μεταφυτευτικό σοκ). Βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω τακτικών εφαρμογών στην συνιστώμενη δόση.

Για αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής ανά καλλιέργεια συμβουλευτείτε τους γεωπόνους της Syngenta.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά την συσκευασία πριν από τη χρήση. Προσθέστε την μισή ποσότητα νερού που απαιτείται στον ψεκαστήρα/βυτίο ανάμιξης στην συνέχεια προσθέστε το προϊόν και τέλος το υπόλοιπο νερό. Αναδεύστε το ψεκαστικό διάλυμα πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
Πλύνετε τον εξοπλισμό σχολαστικά με νερό μετά από κάθε χρήση.

Συνδυαστικότητα:

Το ISABION μπορεί να συνδυαστεί σε μίγμα βυτίου με όλα τα λιπάσματα, χημικά σκευάσματα και πολλά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Μην συνδυάζετε το ISABION με ελαιούχα σκευάσματα.

Σε περίπτωση συνδυασμού με θειούχα σκευάσματα σε εφαρμογές φυλλώματος και ειδικά στο θερμοκήπιο να μην υπερβαίνει την δόση των 200 κ.εκ. σκευ. ανά εκατόλιτρο ψεκαστικού διαλύματος. Σε περίπτωση συνδυασμού με χαλκούχα σκευάσματα συνιστάται η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Σε περίπτωση εφαρμογών με χαλκούχα σκευάσματα, συνιστάται η τήρηση 2-4 ημερών από την εφαρμογή του ISABION.

Μην συνδυάζετε το σκεύασμα με περισσότερο από 2 άλλα σκευάσματα σε μίγμα βυτίου.

Για αποφυγή ρίσκου φυτοτοξικότητας στην δαμασκηνιά να μην υπερβαίνει την συνιστώμενη δόση.

Συνιστάται η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή σε περίπτωση έλλειψης εμπειρίας με συγκεκριμένες ποικιλίες ή συνδυασμού με άλλα προϊόντα. Επικοινωνήστε με την Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ για περισσότερες τεχνικές συμβουλές.

Η εταιρία διανομής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από την χρήση του σκευάσματος που θα προκύψουν λόγω παράβλεψης των οδηγιών της παρούσας ετικέτας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Δεν απαιτούνται όρια υπολειμμάτων – μπορεί να συγκομίστηκε αμέσως μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

