

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, μακριμάνικο πουκάμισο και γάντια. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποκαμεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να προημιόνη. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρήση και τα κομμάτια με οξύμωμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για τις χρήσεις στα ανατομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισηγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί: • Στο αμπέλι και στα μηλοειδή η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπολοίπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα και καλλιανθοειδή) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs το 50% των συνολικών επεμβάσεων. • Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μπλήα, Αχλάδι, Κυδωνία, Βερικοκιά, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Αγκινάρα, Αμπέλι επιτραπέζιο, Καννός: 14 ημέρες, Αμπέλι οπωνοποιοί: 21 ημέρες, Φράουλες, Αγγούρι, Κολλοκυθάκι, Κολλοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα: 3 ημέρες, Ανθοκομικά: δεν ορίζεται.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

L1058677 GREC/12X PPE4115525



Topas[®]
100 EC

syngenta[®]

Penconazole (πενκοναζόλη)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Γεωργ.: 60437/18-12-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Penconazole 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 89,36% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

με προστατευτική και

θεραπευτική δράση για

την καταπολέμηση του

ωιδίου σε μηλοειδή,

πυρηνόκαρπα, αμπέλι,

λαχανικά, καπνό,

ανθοκομικά και άλλες

καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για

επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής

Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος,

Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

400 ml e



- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μπλήα, Αχλάδι, Κυδωνία: Για Qidilio (Podosphaera leucotricha) 25-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-140 λίτρα/στρέμμα. BBCH 71-78. Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm έως το στάδιο καρπών με διάμετρο 80% του τελικού μεγέθους. ** Δόση σκευάσματος 0,25 λίτ./HA LWA. Έως 3 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερικοκιά:** Για Qidilio (Podosphaera leucotricha) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 71-89. Από το στάδιο του οξισιόματος της στεφάνης έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αμπέλι:** Για Qidilio (Erysiphe necator) 30 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 53-79. Από την εμφάνιση ταξιανθίας έως το κλείσιμο του ταξιανθίου. Έως 3 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αγκινάρα:** Για Qidilio (Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum) 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 51-81. Από την έναρξη της επιμύκησης του ανθικού στελέχους έως το κλείσιμο του πάνω μέρους του 10-20% των ανθοκεφαλών (μετά το στάδιο της συγκομιδής για ωπή κατανάληψη). Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φράουλα (αγρού), Θερμοκνήμιου:** Για Qidilio (Podosphaera aphanis) 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 41-89. Έναρξη ανάπτυξης στολίων (οροστί, περίπου 2cm) έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολλοκύθα:** (αγρού - θερμοκνήμιου): Για Qidilio (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. BBCH 51-89. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στο κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Κολλοκυθάκι (αγρού - θερμοκνήμιου):** Για Qidilio (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. BBCH 51-79. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στο κύριο βλαστό έως ότου 9 ή περισσότεροι καρποί στον κύριο βλαστό να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Πιπεριά (αγρού, θερμοκνήμιου):** Για Qidilio (Leveillula taurica) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 55-89. Από την εμφάνιση του 5ου κλειστού ανθού, έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μελιτζάνα (αγρού - θερμοκνήμιου):** Για Qidilio (Leveillula taurica, Oidium neolyopersici) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 51-89. Από την εμφάνιση του 1ου κλειστού ανθού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Τομάτα (αγρού - θερμοκνήμιου):** Για Qidilio (Leveillula taurica, Oidium neolyopersici) 35-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 21-89. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Σμέουρα, Βατόμουρα:** Για Qidilio (Podosphaera aphanis) 40 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Έως το στάδιο BBCH 89 (έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών). 1 εφαρμογή. **Καννός:** Για Qidilio (Erysiphe cichoracearum) 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 20-99. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Ανθοκομικά (αγρού, θερμοκνήμιου):** Τριανταφυλλιά για Sphaerotheca pannosa, Phragmidium sp., Μηνγκόνια για Erysiphe sp., Ντάλια για Sphaerotheca sp., Καλέντουλα για Oidium sp., Ρuccinia sp., Χρυσάνθεμο για Puccinia horiana, Πεταργόνιο για Puccinia pelargonizionalis, Γαρυφαλλιά για Puccinia sp., Ποτεντίλα για Puccinia sp., Αγγελική για Oidium evonymi japon, Japanese spindle tree Oidium sp., Αλφειά για Puccinia sp.: 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. BBCH 13-89. Με την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλλου/οπίσθιου/ζεύγους φύλλων έως την ωρίμανση των σπόρων/ καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 7-12 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις: ** HA LWA: 10.000 m2 έκταση επιφάνειας κόμης.

Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).