

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

TUSAL[®]

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Trichoderma asperellum T25: 0,43% β/β (που ισοδυναμεί σε min 1x10⁸ CFU/g)

Trichoderma atroviride T11: 0,33% β/β (που ισοδυναμεί σε min 1x10⁸ CFU/g)

Βοηθητικές ουσίες: 99,24% β/β

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Υπολογίζεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι προτάσεις και οι πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων δοκιμών και αυστηρών μελετών. Ωστόσο, κατά τη χρήση, ενδέχεται να επηρεάσουν πολλοί παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό μας (τρόπος εφαρμογής, καιρός κλπ.). Η εταιρεία εγγυάται για τη σύνθεση, τη σύσταση και το περιεχόμενο του προϊόντος όσο αυτό παραμένει στην αρχική του συσκευασία. Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα (μειωμένη αποτελεσματικότητα, τοξικότητα κλπ.) λόγω ολικής ή μερικής μη τήρησης των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Βιολογικό μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, για την αντιμετώπιση μυκήτων εδάφους, σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Αποτελείται από φυσικά στελέχη του *Trichoderma asperellum* T25 και του *Trichoderma atroviride* T11 τα οποία δημιουργούν αποικίες στο έδαφος. Δρα συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους δράσης όπως: ανταγωνισμό για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά, παρασιτισμό και αποδόμηση των μυκητιακών δομών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Προσβολή λαϊμού και ριζών, φυτάρων και καρπών από Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.), 50-200 γρ./στρ. 1η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση ή έως 2-3 εβδομάδες μετά και οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 21 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Προσβολή λαϊμού και ριζών, φυτάρων και καρπών από Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.), Φουζαρίωση (*Fusarium* spp.), Ριζοκτόνια (*Rhizoctonia solani*), Πύθιο (*Pythium* spp.), Σκληρωτινίαση (*Sclerotinia sclerotiorum*), 100 γρ./στρ. για την 1η εφαρμογή και 50 γρ./στρ. για τις επόμενες εφαρμογές. 1η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση και οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 15-30 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 5 εφαρμογές ανά 15-30 ημέρες.

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Προσβολή λαϊμού και ριζών, φυτάρων και καρπών από Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.), Φουζαρίωση (*Fusarium* spp.), Ριζοκτόνια (*Rhizoctonia solani*), Πύθιο (*Pythium* spp.), Σκληρωτινίαση (*Sclerotinia sclerotiorum*), 100 γρ./στρ. για την 1η εφαρμογή και 50 γρ./στρ. για τις επόμενες εφαρμογές. 1η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση και οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 15-30 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 5 εφαρμογές ανά 15-30 ημέρες.

Μαρούλι και παρόμοια σαλατικά, Σκαρόλα (πικριδα), Λυκοτριβολο, Ρόκα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Σκληρωτινίαση (*Sclerotinia sclerotiorum*), 100 γρ./στρ. για την 1η εφαρμογή και 50 γρ./στρ. για τις επόμενες εφαρμογές. 1η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση και οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 15-30 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 5 εφαρμογές ανά 15-30 ημέρες.

Καλλιπωστικά και Ανθοκομικά φυτά, Δένδρα, Θάμνοι, Δρεπά άνηθ, Τριανταφυλλίες, Βολβοί (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Προσβολή λαϊμού και ριζών, φυτάρων και καρπών από Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.), Φουζαρίωση (*Fusarium* spp.), Ριζοκτόνια (*Rhizoctonia solani*), Πύθιο (*Pythium* spp.), Σκληρωτινίαση (*Sclerotinia sclerotiorum*), 100 γρ./στρ. για την 1η εφαρμογή και 50 γρ./στρ. για τις επόμενες εφαρμογές. 1η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση και οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 15-30 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 5 εφαρμογές ανά 15-30 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ:
0,5 Kg

 **Timac AGRO**



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Οι ανοιχτάκιες εφαρμογές στην φράουλα γίνονται μετά το λήθαργο, όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι 10 - 15°C. Η μέγιστη δόση / καλλιεργητική περίοδο είναι 600 γραμ./στρ.
3. Στα λαχανικά, καλλυπυστικά και ανθοκομικά φυτά η μέγιστη δόση / καλλιεργητική περίοδο είναι 300 γραμ./στρ.
4. Η θερμοκρασία του εδάφους κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι >12°C και <37°C. Η κατάλληλότερη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 25-30°C.
5. Το pH του εδάφους πρέπει να είναι >2 και <9. Το κατάλληλότερο pH για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 4-7.
6. Η εδαφική υγρασία και η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία του εδάφους είναι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του μύκητα. Η κατάλληλη εδαφική υγρασία είναι 70-80%.
7. Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε άλατα αναστέλλει την ανάπτυξη του μύκητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, προς το τέλος της άρδευσης, με όγκο νερού 200 λίτρων/στρ., ώστε να εξασφαλίζεται καλή διανομή του προϊόντος γύρω από το ριζικό σύστημα των φυτών.

Τρόπος παρασκευής φεκαστοκού υγρού:

Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα του προϊόντος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη συγκέντρωση του σκευάσματος. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 12 ώρες, από τη διάλυση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επειδή δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο σκεύασμα είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο σε προγράμματα για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:

Δεν είναι φυτότοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Μαρούλι και παρόμοια σαλατικά, Σκαρόλα (πικρία), Λυκτρίβολο, Ρόκα, κ.α. (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 1 ημέρα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την

ανάμιξη/φόρτωση. • "Περιέχει τους μικροοργανισμούς *Trichoderma atroviride* T11 και *Trichoderma asperellum* T25. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση". • Διάθεση περιχομένου/περιέκτη σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς • Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Φυλάξτε το στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, σκοτεινό καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία 4°C παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **0,5 kg**



Κάτοχος της άδειας:

Timac Agro España SA
Polígono Industrial de Arazuri-Orcoyen, Calle C, num. 32,
CP 031160, Orcoyen, Navarra-Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-Διανομή:

ΛΥΔΑ Α.Ε. Άρτας 9 & Μακρυγιάννη 153 54, Γλυκά Νερά
Τηλ: 210 6218747 E-mail: lyda@gr.timacagro.com

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60566/4-11-2016



Προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007